

HINWEISE ZU DEN EINZELSAATEN

Die Liste enthält alle Arten, die wir prinzipiell anbieten, Nomenklatur nach der Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, Wisskirchen & Haeupeler 1998/Hrsg. Bundesamt f. Naturschutz (ältere handelsübliche Bezeichnungen mit Verweis in der Liste).

Alle Artikel ohne Erläuterung sind wild heimisch, d.h. Wildformen einheimischer Arten, die in Deutschland bzw. angrenzenden Ländern im dazugehörigen Vegetationsraum geerntet sind (auch aus Nachbau). Einige Arten führen wir zusätzlich aus anderen Herkunft; wir kennzeichnen diese Artikel als

wild nicht heimisch: Außerhalb des oben genannten Vegetationsraums geerntete Wildform einer einheimischen Art.

Als Ergänzung zu unsere Wildsamen-Sortiment bieten wir auch Kulturformen von Heil- und Medizinalpflanzen sowie landwirtschaftliches Saatgut (Klee, Gräser) an. Wir kennzeichnen diese Artikel als

Kulturform: Kulturform einer in Deutschland heimischen Art

Kulturpflanze: In Deutschland nicht heimische Art; das Angebot kann sich sowohl auf eine Wild- als auch auf eine Kulturform beziehen.

Wenn Sie heimisches oder Regio-Saatgut wünschen, bitten wir um die entsprechenden Angaben von Ihnen.

Kaltkeimer: Samen mit langer Keimruhe. Um diese zu durchbrechen, benötigen sie ~~eine zwei bis vier Wochen lange warme, feuchte Periode und danach~~ eine lang anhaltende Kälteperiode bei circa -4 Grad Celsius. Die Samen werden im Herbst ausgesät, befinden sich im Winter in der Kälteperiode und beginnen im Frühjahr aufzulaufen.

Hartschalig: Samen mit harter bzw. dickwandiger Samenschale. Hier sorgt die Natur für eine Keimung über mehrere Jahre hinweg: Nur ein Teil keimt im Jahr nach der Aussaat, die anderen in den folgenden Jahren.

TKM: Gewicht in Gramm von 1000 Körnern Saatgut. Bei dieser Angabe handelt es sich um Mittelwerte aus unserem Qualitätslabor. Wir empfehlen Aussaatstärken von 500 bis 1000 Körnern pro Quadratmeter.

Höhe: Der angegebene Wert ist nur ein Anhaltspunkt und kann je nach Standort stark variieren.

Blütenfarbe: Die Punkte versuchen die Blütenfarbe wiederzugeben. Das Grassymbol kennzeichnet alle Gräser (Süß-, Sauer,...). Mehrfarbige Blüten sind mit nur einer Farbe angegeben bzw. mit zwei überlappenden Punkten. Bei zwei getrehten Punkten kann es Blüten beider Farben geben.

Pflanzengesellschaft: Zuordnungen zu natürlichen Pflanzengesellschaften (Standard nach Oberdorfer). Aus denjenigen Arten, die in allen Regionen Deutschlands für die Pflanzengesellschaft des jeweiligen Standorts typisch sind, haben wir unsere 10 Appel-WPS-Mischungen zusammengestellt (s. S. 14 - 15).

Feuchte/Licht/Bodenreaktion pH: Die Angaben beziehen sich auf Zeigerwerte von Ellenberg. Sie geben Auskunft über das Auftreten der Pflanzen im Gelände, beschreiben also nicht die Ansprüche bzw. das physiologische Optimum der Pflanzen.

Heil- oder Genusspflanze: Für den professionellen Anbau von Heilpflanzen fragen Sie uns bitte nach der Medizinalform der jeweiligen Art, da bei den Wildformen keine Garantie für die Inhaltsstoffe gegeben werden kann.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Irrtum vorbehalten.

EINZELSAATEN



	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Achillea millefolium Schafgarbe	❖		0,16	2	30	○●	6-10	2	●	●	●	R	*
Achillea millefolium wild nicht heimisch Schafgarbe			0,16	2	30	○●	6-10		●	●	●		
Achillea ptarmica Sumpfschafgarbe	❖		0,30	2	40	○●	7-8	2	●	4	●		
Actaea spicata Christophskraut		❖	8,00	2	45	○	5-7	10	●	6			
Aegopodium podagraria Giersch	❖		3,50	2	65	○	5-7	10	●	7	●		*
Agrimonia eupatoria Gewöhnlicher Odermennig	❖	★	25,00	2	60	●	7-9	9	●	8		R	
Agrimonia procera Großer Odermennig	❖	★	45,00	2	75	●	6-8	9	●	6		R	
Agropyron repens → Elymus repens													
Agrostemma githago Kornrade			7,50	⊙	65	●	6-9	4	%	●	%	●	R
Agrostis canina Hundsstraußgras			0,05	2	30	■	6-8	1	●	3			
Agrostis capillaris Rotes Straußgras	❖		0,10	2	30	■	6-8	2	%	●	6		
Agrostis capillaris Kulturform Rotes Straußgras			0,10	2	30	■	6-8		%	●			
Agrostis gigantea Weißes Straußgras			0,06	2	90	■	6-7	2	●	7			
Agrostis stolonifera Flechtstraußgras			0,08	2	105	■	6-7	1	●	%			
Ajuga genevensis Genfer Günsel	❖	❖	1,40	2	20	●	4-6	6	●	7	●		
Ajuga reptans Kriechender Günsel	❖	❖	1,40	2	23	●	4-7	2	●	6			
Alchemilla vulgaris Gemeiner Frauenmantel		❖	0,60	2	50	●	5-9	2	●				*
Alisma plantago-aquatica Froschlöffel	❖		0,35	2	55	○	6-8	1	●	%			
Alliaria petiolata Knoblauchsrauke	❖	❖	2,00	⊙	65	○	4-5	4	●	7	●	R	
Allium schoenoprasum Kulturform Schnittlauch		❖	1,10	2	22	●	5-8		%	●	●		*
Allium scorodoprasum Wilder Lauch			20,00	2	80	●	6-7	10	●	7			

❖ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheingraben in Produktion ■ Gras ⊙ einjährig ⊙ zweijährig 2 Staude **Planzen-**
gesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft, 6 Kalkmagerrasen 7 Steppen-
rasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldboden **Schmetterlinge:** Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.

● trocken ● mäßig feucht ● feucht ● sehr feucht ● sonnig ● schattig ● halbschattig % indifferent

	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütemonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenteaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Heil-/Genusspfl.
Allium sphaerocephalon Kugellauch			1,40	2	40	●	6-7	6	●	8	●	
Allium ursinum Bärenlauch	❖	❄️	5,00	2	25	○	4-5	10	●	7	●	*
Allium vineale , Brutzwiebeln Weinbergslauch	❖		20,00	2	50	●	6-8	5	●			
Alopecurus geniculatus Knickfuchsschwanz	❖		0,20	⊙	20	■	5-9	4	●	7		
Alopecurus myosuroides Ackerfuchsschwanz	❖		2,50	⊙	30	■	6-7	4	●	7		
Alopecurus pratensis Wiesenfuchsschwanz			1,00	2	70	■	5-6	2	●	6		
Alopecurus pratensis Kulturform			1,00	2	70	■	5-6		●			
Alopecurus pratensis Wiesenfuchsschwanz												
Amaranthus retroflexus Rauhaariger Fuchsschwanz	❖		0,45	⊙	45	○	7-9	4	●			
Anagallis arvensis Ackergraschmelze	❖		0,65	⊙	8	●	6-10	5	●	%		*
Anchusa arvensis Krummhals			5,50	⊙	30	○	5-7	5	●		●	
Anchusa officinalis Ochsenzunge	❖		6,00	⊙	55	●	4-10	5	●	7	●	*
Anemone nemorosa Buschwindröschen	❖	❄️	2,00	2	13	○	3-4	10	●	%	●	
Anemone ranunculoides Gelbes Windröschen			2,00	2	15	●	4-5	10	●	8		
Angelica archangelica Engelwurz		❄️	5,50	⊙	175	○	6-8	4	●			*
Angelica sylvestris Waldengelwurz	❖	❄️	2,00	2	150	○	7-8	2	●	%		
Antennaria dioica Katzenpfötchen			0,11	2	15	○	5-6	7	●	3	F	*
Anthemis nobilis → Chamaemelum nobilis												
Anthemis tinctoria Färberkamille			4,50	2	35	●	6-9	4	●	6	●	
Anthericum liliago Traubige Graslinie		❄️	4,00	2	45	○	5-6	9	●	5		
Anthericum ramosum Ästige Graslinie		❄️	4,50	2	50	○	6-8	9	●	7	●	
Anthoxanthum odoratum Geruchgras	❖		0,60	2	25	■	4-6	%	%	5		
Anthriscus sylvestris Wiesenkerbel	❖	❄️	3,50	2	100	○	4-6	3	●			
Anthyllis vulneraria Wundklee	❖		2,50	2	20	○	6-9	6	●	8	●	R *
Anthyllis vulneraria wild nicht heimisch Wundklee			2,50	2	20	○	6-9		●		●	R *

❖ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberheingraben in Produktion ■ Gras ⊙ einjährig ⊙ zweijährig 2 Staude

Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft,

6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldboden



	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütemonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenteaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Heil-/Genusspfl.
Apera spica venti Windhalm	❖		0,12	⊙	20	■	6-7	4	●			
Aquilegia vulgaris Akelei			1,50	2	55	●	5-7	9	●	7	●	
Arabis thaliana Schmalwand	❖		0,01	⊙	18	○	4-5	8	●	4		
Arctium lappa Große Klette	❖		11,00	⊙	120	●	7-9	4	●	7	●	*
Arctium tomentosum Filzige Klette	❖		9,50	⊙	90	●	7-8	4	●	9		
Arenaria serpyllifolia Quendelsandkraut			0,60	⊙	12	○	5-9	4	●			
Armeria maritima Grasnelke	❖		1,50	2	30	●	5-10		●	5	●	
Arnica montana Bergwohlverleih		❄️	1,10	2	40	●	7-8	7	●	3		*
Arrhenatherum elatius Glatthafer			3,00	2	100	■	6-7	3	%	7		
Arrhenatherum elatius Kulturform			3,00	2	90	■	6-7		%			
Artemisia campestris Feldbeifuß	❖		0,10	2	55	●	8-10	8	●	5		
Artemisia vulgaris Beifuß	❖		0,11	2	95	●	7-9	4	●			*
Arum maculatum Aronstab	❖	❄️	35,00	2	22	○	4-5	10	●	7		
Aruncus dioicus Wald-Geißbart			0,09	2	115	○	6-7	10	●			
Asarum europaeum Haselwurz			4,00	2	8	●	3-5	10	●	8		*
Aster amellus Kalkaster			0,80	2	11	●	6-9	9	●	9		
Astragalus glycyphyllos Bärenschote	❖	★	5,00	2	20	○	5-6	9	●	7		R
Astrantia major Große Sternadolde		❄️	3,00	2	60	○	6-8	9	●	8	●	
Atropa bella-donna Tollkirsche			1,10	2	105	●	6-8	9	●	8		
Avena fatua Flughafer	❖	★	20,00	⊙	90	■	6-8	4	●	7		
Ballota nigra Schwarznessel	❖		0,70	2	80	●	7-9	4	●	%	●	F *
Barbarea vulgaris Echtes Barbenkraut	❖		0,50	2	60	●	4-8	5	●	%		*
Bellis perennis Gänseblümchen	❖		0,10	2	10	○	2-11	3	●			*

● trocken ● mäßig feucht ● feucht ● sehr feucht ● sonnig ● schattig ● halbschattig % indifferent

Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.



	Kaltkeimer Hartschalig TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenteaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Bellis perennis Kulturform Gänseblümchen	0,15 2	10	○	2–11		●	●				
Berteroa incana Graukresse	0,60 30	30	○	6–9	5	●	●	6	●		
Betonica officinalis Heilziest	1,30 2	45	●	6–8	2	●	●	●		*	
Bistorta officinalis Wiesenknöterich	5,50 2	55	●	5–7	2	●	●	5	●	R	
Borago officinalis Kulturpflanze Borretsch	19,00 2	45	●	6–8		●	●	●		*	
Brachypodium pinnatum Fiederzwenke	3,00 2	55	●	6–8	6	●	●	7	●	R	
Brachypodium sylvaticum Waldzwenke	4,00 2	60	●	7–8	10	●	●	6			
Briza maxima Kulturpflanze Großes Zittergras	5,00 2	45	●	5–7							
Briza media Zittergras	0,70 2	35	●	5–7	6	●	●	●			
Bromus erectus Aufrechte Trespe	5,00 2	45	●	5–7	6	●	●	8	●	R	
Bromus hordeaceus Weiche Trespe	3,50 2	35	●	5–6	4	●	●	●			
Bromus inermis Unbewehrte Trespe	4,00 2	65	●	6–7	4	●	●	8			
Bromus mollis → Bromus hordeaceus	5,50 2	40	●	5–6	2	●	●	5			
Bromus racemosus Traubige Trespe	5,00 2	100	●	6–8	9	●	●	8			
Bromus ramosus Waldtrespe	7,00 2	55	●	6–7	4	●	●	●			
Bromus secalinus Roggentrespe	6,00 2	40	●	5–6	4	●	●	●			
Bromus sterilis Taubes Trespe	3,00 2	20	●	5–6	4	●	●	8			
Bromus tectorum Dachtrespe	35,00 2	70	●	4–6	4	●	●	8			
Bunias orientalis Oriental. Zäckenschötchen	0,70 2	45	●	6–9	9	●	●	9			
Buphtalmum salicifolium Ochsenauge	8,00 2	10	●	5–10	5	●	●	8			
Calendula arvensis Ackerringelblume	8,00 2	40	●	5–10	●	●	●	●		*	
Calluna vulgaris in Kapseln Heidekraut	1,60 2	35	●	8–9	7	●	●	●	●	R	

♦ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheinregion in Produktion ● Gras ○ einjährig ☉ zweijährig 2 Staude

Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft,

6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldboden



	Kaltkeimer Hartschalig TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenteaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Caltha palustris Sumpfdotterblume	0,90 2	23	●	4–6	2	●	●	●	●		
Camelina sativa Saatleindotter	0,40 2	60	●	5–6	4	●	●	6	●		
Campanula glomerata Knäuelglockenblume	0,12 2	35	●	6–9	6	●	●	7	●		
Campanula patula Wiesenglockenblume	0,02 2	40	●	5–7	3	●	●	7	●		
Campanula persicifolia Pfirsichblättr. Glockenblume	0,05 2	55	●	6–8	9	●	●	8	●		
Campanula rapunculoides Ackerglockenblume	0,16 2	55	●	6–9	9	●	●	8	●		
Campanula rapunculus Rapunzelglockenblume	0,02 2	55	●	6–8	6	●	●	6	●		
Campanula rotundifolia Rundblättr. Glockenblume	0,06 2	30	●	6–9	6	●	●	●	●		
Campanula trachelium Nesselblättr. Glockenblume	0,16 2	60	●	7–8	10	●	●	8	●		
Capsella bursa pastoris Hirtentäschelkraut	0,10 2	30	●	3–10	5	●	●	●			
Cardamine pratensis Wiesenschaukraut	0,55 2	20	●	4–6	2	●	●	●	●	R	
Carduus acanthoides Wegdistel	1,80 2	65	●	5–10	5	●	●	●			
Carduus nutans Nickende Distel	2,00 2	65	●	7–9	5	●	●	8	●	F	
Carex acutiformis Sumpfschilf	1,00 2	65	●	5–6	2	●	●	7	●		
Carex flacca Blaugrüne Segge	0,80 2	25	●	5–6	6	●	●	8	●		
Carex leporina Hasenpfotensegge	0,50 2	35	●	5–7	7	●	●	3	●		
Carex pendula Hängessegge	0,70 2	100	●	5–6	10	●	●	6	●		
Carex pseudocyperus Scheinzypergras-Segge	0,75 2	65	●	6	1	●	●	6	●		
Carex remota Winkelsegge	0,30 2	40	●	5–7	10	●	●	7	●		
Carex sylvatica Waldsegge	1,50 2	40	●	4–6	10	●	●	7	●		
Carex vesicaria Blasensegge	1,90 2	50	●	5–6	1	●	●	6	●		
Carex vulpina Fuchssegge	3,00 2	65	●	5	1	●	●	●			
Carlina acaulis Silberdistel	3,00 2	20	●	7–9	6	●	●	●			
Carlina vulgaris Golddistel	1,10 2	30	●	7–9	6	●	●	7	●		

● trocken ● mäßig feucht ● feucht ● sehr feucht ● sonnig ● schattig ● halbschattig ● indifferent

Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.



	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonat	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Carum carvi Kümmel			3,00	60	○	5-7	3	♂	♀	%			
Carum carvi Kulturform Kümmel			4,00	60	○	5-7		♂	♀				*
Centaurea cyanus Kornblume	❖		4,00	55	●	6-10	5	%	♀	%	●		
Centaurea cyanus Kulturform Kornblume			5,00		●	6-9					●		
Centaurea jacea Wiesenflockenblume	❖		1,20	4	●	6-10	6	%	♀	%	●	R	
Centaurea nigra Schwarze Flockenblume	❖		1,70	4	●	7-8	7	♂	♀	3	●		
Centaurea scabiosa Skabiosenflockenblume	❖		5,00	4	●	6-9	6	♂	♀	8	●		
Centaurea stoebe Rispige Flockenblume	❖		2,00	4	●	7-9	8	♂	♀	8	●		
Centaureum erythreum Tausendgüldenkrout	❖		0,01	30	●	7-9	9	♂	♀	6			*
Centaureum umbellatum → Centaureum erythreum													
Cerastium arvense Ackerhornkraut	❖		0,13	4	○	4-7	6	♂	♀	6			
Cerastium fontanum Quellhornkraut	❖		0,20	4	○	4-10	3	♂	♀	5			
Chaerophyllum aureum Goldkälberkrout		❖	8,00	4	○	6-7	5	♂	♀	9			
Chaerophyllum bulbosum Knolliger Kälberkrout	❖	❖	2,50	130	○	6-8	5	♂	♀	8			
Chaerophyllum hirsutum Rauhaariger Kälberkrout		❖	8,00	4	○	5-7	2	♂	♀	%			
Chaerophyllum temulum Heckenkälberkrout	❖	❖	3,00	65	○	5-7	6	♂	♀	%			
Chamaemelum nobilis Kulturpflanze Römische Kamille			0,13	4	○	7-10							*
Chelidonium majus Schöllkraut	❖		0,70	4	●	5-9	5	♂	♀	%			*
Chenopodium album Weißer Gänsefuß	❖		0,70	55	○	7-9	4	♂	♀	%			*
Chenopodium bonus-henricus Guter Heinrich		❖	2,50	4	○	6-8	4	♂	♀				
Chrysanthemum segetum Saatwucherblume			1,10	35	●	5-10	5	♂	♀	5			
Chrysanthemum segetum Saatwucherblume Kulturform			2,00		●	6-8		♂	♀				
Chrysanthemum vulgare Rainfarn	❖		0,10	4	●	7-9	5	♂	♀	8	●		

❖ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheingraben in Produktion ❖ Gras ○ einjährig ♂ zweijährig 4 Staude

Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft,

6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldboden

	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonat	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Cichorium intybus Wegwarte	❖		1,30	4	●	7-8	5	♂	♀	8			*
Cichorium intybus Kulturform Wegwarte			1,70	4	●	6-10		♂	♀				*
Circaea lutetiana Gewöhnliches Hexenkrout	❖		1,60	4	○	6-9	10	♂	♀	7			
Cirsium arvense Ackerkratzdistel	❖		1,10	85	●	7-8	4	%	♀		●	F	
Cirsium eriophorum Wollköpfige Kratzdistel	❖		9,00	120	●	7-9	5	♂	♀	9		F	
Cirsium oleraceum Kohldistel	❖		2,00	4	○	7-9	2	♂	♀	8	●	F	
Cirsium palustre Sumpfkatzdistel	❖		1,00	100	●	7-9	2	♂	♀	4	●	F	
Cirsium vulgare Gewöhnliche Kratzdistel	❖		2,50	120	●	7-9	5	♂	♀			F	
Clinopodium vulgare Wirbeldost	❖		0,40	4	●	7-10	9	♂	♀	7			
Colchicum autumnale Herbstzeitlose	❖	❖	6,50	4	●	8-10	1	♂	♀	7			
Conium maculatum Gefleckter Schierling	❖		3,00	150	○	7-8	4	♂	♀				*
Consolida regalis Ackerrittersporn	❖		1,00	35	●	6-8	4	♂	♀	8	●		
Convolvulus arvensis Ackerwinde	❖		9,00	60	○	6-9	4	♂	♀	7		R	
Coriandrum sativum Kulturpflanze Koriander			7,00		○	6-7		♂	♀		●		*
Coronilla varia → Securigera varia													
Corydalis cava Hohler Lerchensporn		❖	4,50	4	●	3-4	10	♂	♀	8	●		
Corydalis solidia Fester Lerchensporn	❖	❖	1,50	4	●	3-4	10	♂	♀	7	●		
Corynephorus canescens Silbergras	❖		0,10	4	●	6-7	8	♂	♀	3			
Crepis biennis Wiesenpippau	❖		0,95	60	●	5-6	3	♂	♀	6	●		
Crepis capillaris Kleinköpfiger Pippau	❖		0,45	4	●	6-9	3	♂	♀	5			
Cymbalaria muralis Zimbelkraut	❖		0,10	4	●	6-11		♂	♀	8	●		
Cynoglossum officinale Gemeine Hundszunge	❖		25,00	45	●	5-7	5	♂	♀	7	●		
Cynosurus cristatus Kammgras			0,60	4	●	6-7	2	♂	♀	%			
Cynosurus cristatus Kulturform Kammgras			0,65	4	●	6-7		♂	♀				

♂ trocken ♀ mäßig feucht ♂ feucht ♀ sehr feucht ● sonnig ● schattig ● halbschattig % indifferent

Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.



	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenteaktion	pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Cytisus scoparius Besenginster		★	6,50	2	125	●	5-7	10	●	3				
Dactylis glomerata Kulturform Wiesen-Knaulgras			1,00	2	65	■	5		●			R		
Datura stramonium Gemeiner Stechapfel	✦		9,00	⊙	60	○	7-9	4	●			F	*	
Daucus carota Wilde Möhre	✦	❄	0,85	⊙	50	○	6-9	6	●	■		R		
Deschampsia caespitosa Rasenschmieie	✦		0,25	2	85	■	7-9	2	●	■				
Deschampsia flexuosa Schlängelschmieie	✦		0,40	2	35	■	6-8	10	■	●	2			
Dianthus armeria Büschelnelke			0,25	⊙	40	●	6-7	9	●	3		F		
Dianthus carthusianorum Karthäusernelke	✦		0,85	2	28	●	6-9	6	●	7		F		
Dianthus deltoides Heidenelke	✦		0,19	2	20	●	6-9	7	●	3		F		
Dianthus superbus Prachtnelke	✦		0,95	2	45	●	6-9	2	●	8				
Dictamnus albus Diptam		❄	18,00	2	75	●	5-6	9	●	8			*	
Digitalis grandiflora Kulturform Großblütiger Fingerhut			0,16	2	80	●	6-8		●		●			
Digitalis lanata Kulturform Wolliger Fingerhut			0,35	⊙	80	●	6-8		●				*	
Digitalis lutea Kulturform Gelber Fingerhut			0,35	2	60	○	6-8		●					
Digitalis purpurea Roter Fingerhut	✦		0,07	⊙	85	●	6-7	9	●	3	●		*	
Dipsacus fullonum Wilde Karde	✦		3,00	⊙	115	●	7-8	4	●	8	●			
Dipsacus laciniatus Schlitzblättrige Karde	✦		3,50	⊙	160	○	7-8	4	●	■	●			
Echinacea purpurea Kulturpflanze Roter Sonnenhut			3,50	2	110	●	7-8		●				*	
Echinochloa crus-galli Hühnerhirse	✦		1,80	⊙	55	■	7-10	4	●	5				
Echinops sphaerocephalus Kugeldistel	✦		26,00	2	75	●	7-8	5	●	8	●			
Echium vulgare Natternkopf	✦	★	2,50	⊙	55	●	6-8	5	●	8	●	R		
Elymus repens Quecke			3,00	2	75	■	6-7	4	■	■				

✦ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheingraben in Produktion ■ Gras ⊙ einjährig ⊙ zweijährig 2 Staude

Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft,

6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldboden

	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenteaktion	pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Epilobium angustifolium Schmalblättr. Weidenröschen	✦		0,05	2	85	●	6-8	9	●	3	●	R		
Epilobium hirsutum Zottiges Weidenröschen	✦		0,12	2	90	●	6-9	2	●	8				
Eragrostis minor Kleines Liebesgras	✦		0,10	⊙	12	■	7-11	4	●	■				
Erodium cicutarium Reiherschnabel	✦		2,00	⊙	18	●	4-9	8	●	■	●	R		
Eryngium campestre Feldmannstreu	✦		1,60	2	35	●	7-8	6	●	8				
Eupatorium cannabinum Wasserdost	✦		0,25	2	110	●	7-9	4	●	7				
Euphorbia cyparissias Zypressenwolfsmilch	✦	❄	2,50	2	25	●	4-6	6	●	■				
Euphorbia helioscopia Sonnenwendwolfsmilch	✦		2,50	⊙	18	○	4-10	4	●	7		R		
Fagopyrum esculentum Kulturpflanze Buchweizen			30,00	⊙	40	○	7-10				●		*	
Falcaria vulgaris Sichelmöhre	✦		1,20	⊙	35	○	6-8	5	●	9				
Festuca cinerea Blauschwingel	✦		0,85	2	30	■	5-6	8	●	8				
Festuca gigantea Riesenschwingel			2,50	2	100	■	7-8	10	●	6				
Festuca ovina Schafschwingel	✦		0,30	2	25	■	5-6		●	3		R		
Festuca ovina Kulturform Schafschwingel			0,30	2	25	■	5-6		●	3		R		
Festuca pallens Blasser Schafschwingel			0,90	2	25	■	5-6	8	●	8				
Festuca pratense Kulturform Wiesenschwingel			2,00	2	55	■	6-7		●					
Festuca rubra fallax Kulturform Horstrotschwingel			0,80	2	40	■	6-7		■					
Festuca rubra rubra Kulturform Ausläuferrotschwingel			1,10	2	40	■	6-7		●	■				
Festuca rubra trichophylla Kulturform Rotschwingel, kurze Ausläufer			0,80	2	40	■	6-7		●					
Festuca rupicola Furchenschwingel			0,90	2	35	■	6-7	6	●	8				
Festuca valesiaca Walliser Schafschwingel			0,60	2	40	■	6-7	6	●	7				

● trocken ● mäßig feucht ● feucht ● sehr feucht ● sonnig ● schattig ● halbschattig ■ indifferent

Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.

	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Heil-/Genusspfl.
Filipendula ulmaria Mädesüß	❖	❄	0,50	2	90	○	6-8	2	🌊	🌞	🐝	R *
Filipendula vulgaris Kleines Mädesüß			0,90	2	45	○	5-7	6	🌊	🌞	8	
Foeniculum vulgare Kulturpflanze Fenchel			7,00	⊙	115	🟡	7-8			🟠	R	*
Fragaria vesca Walderdbeere			0,30	2	15	○	4-6	9	🌊	🌞	🟠	*
Fritillaria meleagris Schachblume			3,00	2	25	🟡	4-5	🌊	🌞	7	🟠	
Fumaria officinalis Erdrauch	❖	❄	3,00	⊙	20	🟡	5-9	5	🌊	🌞	6	🟠 *
Galeopsis tetrahit Gemeiner Hohlzahn	❖	★	4,00	⊙	40	🟡	6-10	9	🌊	🌞	🟠	
Galinsoga parviflora Franzosenkraut	❖		0,20	⊙	45	○	6-10	4	🌊	🌞	5	
Galium aparine Klebkraut	❖	❄	10,00	⊙	100	○	6-10	4	🌊	🌞	6	*
Galium mollugo Wiesenlabkraut	❖		0,60	2	60	○	5-9	3	🌊	🌞	7	R
Galium odoratum Waldmeister	❖	❄	6,50	2	15	○	5	10	🌊	🌞	🟠	*
Galium sylvaticum Waldlabkraut			0,70	2	80	○	6-8	10	🌊	🌞	7	
Galium verum Echtes Labkraut	❖		0,40	2	45	🟡	6-9	9	🌊	🌞	7	🟠 R *
Genista tinctoria Färberginster	❖	★	3,00	2	40	🟡	5-7	2	🌊	🌞	4	R *
Gentiana lutea Kulturform Gelber Enzian		❄	1,30	2	75	🟡	7-8		🌊	🌞		*
Geranium pratense Wiesenstorchschnabel	❖	★	7,50	2	55	🟡	5-8	2	🌊	🌞	8	🟠
Geranium pusillum Kleiner Storchschnabel	❖	★	0,90	⊙	18	🟡	5-9	5	🌊	🌞		R
Geranium robertianum Ruprechtskraut	❖	★	1,60	⊙	30	🟡	5-9	10	🌊	🌞	🟠	*
Geranium sanguineum Blutroter Storchschnabel	❖	★	7,00	2	30	🟡	6-8	9	🌊	🌞	8	🟠 R
Geranium sylvaticum Waldstorchschnabel		★	5,50	2	40	🟡	6-8	9	🌊	🌞	6	
Geum rivale Bachnelkenwurz	❖		1,20	2	50	🟡	4-6	2	🌊	🌞	🟠	🟠
Geum urbanum Echte Nelkenwurz	❖		2,00	2	60	🟡	5-9	4	🌊	🌞	🟠	*
Glechoma hederacea Gundelrebe	❖		0,65	2	10	🟡	3-5	9	🌊	🌞	🟠	*

❖ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheingraben in Produktion 🌱 Gras ⊙ einjährig ⊙ zweijährig 2 Stauden

Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkautflur, 5 Ruderalgesellschaft,

6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldböden

	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Heil-/Genusspfl.
Helianthemum nummularium Gemeines Sonnenröschen	❖		1,00	2	8	🟡	5-6	6	🌊	🌞	7	🟠 R
Helichrysum arenarium Sandstrohlume	❖		0,04	2	20	🟡	7-8	8	🌊	🌞	5	*
Heracleum sphondyleum Wiesenbärenklau	❖		5,50	2	110	○	6-9	3	🌊	🌞	🟠	
Hesperis matronalis Gemeine Nachtkiefer			2,50	⊙	60	🟡	5-7	10	🌊	🌞	7	F *
Hieracium aurantiacum Orangerotes Habichtskraut			0,16	2	35	🟡	6-8	7	🌊	🌞	4	
Hieracium laevigatum Glattes Habichtskraut			0,70	2	95	🟡	6-7	10	🌊	🌞	2	
Hieracium pilosella Langhaariges Habichtskraut	❖		0,13	2	18	🟡	5-10	7	🌊	🌞	🟠	R
Hieracium umbellatum Doldenhabichtskraut	❖		0,50	2	65	🟡	7-10	10	🌊	🌞	4	
Hippocrepis comosa Hufeisenklee		❄	4,00	2	15	🟡	5-7	6	🌊	🌞	7	🟠 R
Holcus lanatus Wolliges Honiggras	❖		0,50	2	40	🌱	6	2	🌊	🌞	🟠	R
Hordelymus europaeus Waldgerste			8,00	2	90	🌱	6-8	10	🌊	🌞	7	
Hordeum murinum Mäusegerste	❖		9,50	⊙	28	🌱	5-8	5	🌊	🌞	5	
Humulus lupulus Hopfen	❖		2,50	2	400	🌱	6-9	10	🌊	🌞	6	R *
Hypericum maculatum Geflecktes Johanniskraut	❖		0,08	2	35	🟡	6-8	7	🌊	🌞	3	
Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut	❖		0,11	2	45	🟡	7-8	9	🌊	🌞	6	🟠 *
Hypericum tetrapetrum Geflügeltes Johanniskraut	❖		0,06	2	45	🟡	6-8	2	🌊	🌞	7	
Hypochoeris radicata Ferkelkraut	❖		0,70	2	35	🟡	6-10	7	🌊	🌞	4	🟠
Hyssopus officinalis Kulturpflanze Ysop			1,10	2	45	🟡	7-9		🌊	🌞	🟠	*
Inula britannica Wiesenalant			0,10	2	40	🟡	7-9	5	🌊	🌞	8	
Inula conyzia Dürrwurz	❖		0,20	2	100	🟡	6-8	9	🌊	🌞	7	*
Inula salicina Weidenblättriger Alant			0,30	2	30	🟡	6-8	2	🌊	🌞	9	
Iris pseudacorus Wasserschwertlilie	❖		40,00	2	75	🟡	5-6	1	🌊	🌞	🟠	🟠
Isatis tinctoria Färberwaid	❖		8,50	⊙	85	🟡	5-6	5	🌊	🌞	8	*
Jasione montana Bergsandglöckchen	❖		0,02	⊙	25	🟡	6-10	8	🌊	🌞	3	🟠

🌱 trocken 🌊 mäßig feucht 🌊 feucht 🌊 sehr feucht 🌞 sonnig 🌱 schattig 🌱 halbschattig 🟠 indifferent

Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.



	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonat	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Juncus acutiflorus Spitzblütige Binse	❖		0,02	2	55	Gras	7-8	2	Blau	5			
Juncus bufonius Krötenbinse	❖		0,03	10	Gras	6-9	4	Blau	3				
Juncus conglomeratus Knäuelbinse	❖		0,01	2	45	Gras	5-7	2	Blau	4			
Juncus effusus Flatterbinse	❖		0,02	2	55	Gras	6-8	2	Blau	3			
Juncus inflexus Blaugrüne Binse	❖		0,03	2	45	Gras	6-8	4	Blau	8			
Knautia arvensis Witwenblume	❖		4,50	2	55	Purpur	7-8	3	Blau	%	●	F	
Koeleria glauca Meergrüne Kammschmiele			0,60	2	35	Gras	6-7	8	Blau	7			
Koeleria macrantha Zierliche Kammschmiele			0,60	2	35	Gras	5-6	6	Blau	8			
Koeleria pyramidata Pyramidenkammschmiele	❖		0,60	2	55	Gras	6-7	6	Blau	7			
Lactuca serriola Wilder Lattich	❖		0,50	85	Orange	7-9	5	Blau	Orange				
Lamium galeobdolon Goldnessel			3,00	2	30	Orange	5-6	10	Blau	7	●		
Lamium album Weiße Taubnessel	❖		1,40	2	35	White	4-10	4	Blau	Orange	●		
Lamium amplexicaule Stengelumfassen. Taubnessel	❖		0,60	20	Pink	3-7	5	Blau	Orange	7	●		
Lamium maculatum Gefleckte Taubnessel			1,80	2	40	Red	4-7	4	Blau	7	●	R	
Lamium purpureum Rote Taubnessel	❖		0,80	20	Pink	3-9	5	Blau	Orange	7	●		
Lapsana communis Gemeiner Rainkohl	❖		1,00	65	Orange	7-9	4	Blau	Orange	%			
Lathyrus pratensis Wiesenplatterbse	❖	★	11,00	2	55	Orange	6-7	2	Blau	7	●	R	
Lathyrus sylvestris Waldplatterbse	❖	★	55,00	2	30	Pink	7-8	9	Blau	8			
Lathyrus tuberosus Erdnussplatterbse	❖	★	32,00	2	60	Pink	6-8	5	Blau	8			
Lathyrus vernus Frühlingsplatterbse		★	15,00	2	30	Pink	3-5	10	Blau	7			
Legousia speculum-veneris Frauenspiegel			0,20	25	Purple	6-8	5	Blau	Orange	8			
Leontodon autumnalis Herbstlöwenzahn			0,70	2	30	Orange	7-9	3	Blau	5	●		
Leontodon hispidus Rauer Löwenzahn			1,10	2	30	Orange	6-9	7	Blau	7	●		
Leonurus cardiaca Echter Löwenschwanz	❖		0,90	2	65	White	6-9	4	Blau	8	●		*

❖ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheingraben in Produktion Gras ⊙ einjährig ⊕ zweijährig 2 Stauden

Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft,

6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldboden



	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonat	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Leucanthemum vulgare Margerite	❖		0,40	2	40	White	5-10	3	Blau	Orange	%	●	
Linaria vulgaris Gemeines Leinkraut	❖		0,14	2	35	Orange	6-9	5	Blau	7		R	
Linum perenne Staudenlein	❖		1,50	2	60	Blue	6-7	6	Blau	8	●		
Linum perenne Kulturform Staudenlein			1,50	2	60	Blue	6-7		Blau	Orange	●		
Linum usitatissimum Kulturpflanze Lein, Flachs			4,50	50	Blue/White	6-7				●		*	
Lolium perenne Deutsches Weidelgras			1,30	2	35	Grass	5-7		Blau	Orange			
Lotus corniculatus Hornschotenklee			1,20	2	18	Orange	5-8	3	Blau	7	●	R	
Lotus corniculatus Kulturform Hornschotenklee			1,20	2	18	Orange	5-8		Blau	Orange	●	R	
Lotus pedunculatus Sumpfschotenklee	❖		0,80	2	50	Orange	5-7	2	Blau	6	●	R	
Lotus uliginosus →	Lotus pedunculatus												
Lunaria annua Judas-Silberling			18,00	65	Purple/White	4-6			Orange	7	●	F	
Lupinus perennis Kulturpflanze			20,00	2	60	Blue	6-9			●			
Lupinus perennis Ausdauernde Lupine			20,00	2	60	Blue	6-9			●			
Lupinus polyphyllus Kulturpflanze			25,00	2	60	bunt	5-9			●			
Lupinus polyphyllus Vielblättrige Lupine			25,00	2	60	bunt	5-9			●			
Luzula campestris Feldhainsimse	❖		0,60	2	10	Grass	3-4	7	Blau	Orange	3		
Luzula luzuloides Buschhainsimse			0,30	2	45	Grass	6-7	10	Blau	Orange	3		
Luzula multiflora Vielblütige Hainsimse	❖		0,45	2	35	Grass	4-5	7	Blau	Orange	5		
Luzula sylvatica Waldhainsimse			0,70	2	55	Grass	4-5	10	Blau	Orange	2		
Lychnis flos cuculi →	Silene flos-cuculi												
Lychnis viscaria Pechnelke			0,08	2	35	Red	5-7	7	Blau	Orange	%	F	
Lycopus europaeus Wolfstrapp	❖		0,25	2	50	White	7-8	1	Blau	Orange	7		
Lysimachia vulgaris Gilbweiderich	❖		0,30	2	100	Orange	6-8	2	Blau	Orange	%		
Lythrum salicaria Blutweiderich	❖		0,04	2	85	Pink	6-9	2	Blau	6	●	R	
Malva alcea Rosenmalve	❖	★	2,00	2	80	Pink	6-9	5	Blau	8	●	*	
Malva moschata Moschusmalve	❖	★	2,00	2	50	Pink	7-9	3	Blau	7	●	R	*

● trocken ● mäßig feucht ● feucht ● sehr feucht ● sonnig ● schattig ● halbschattig % indifferent

Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.

	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütemonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Malva neglecta Wegmalve	❖	★	1,40	⊙	25	⊖	6-9	5	👉	👉	●	R	*
Malva sylvestris Wilde Malve	❖	★	3,00	2	60	⊖	5-9	5	👉	7	●		*
Malva sylvestris Kulturform Kulturmalve		★	1,00	⊙	100	⊖	5-6				●		*
Malva sylvestris mauritanica Kulturpflanze Mauret. Malve		★	3,50	2	60	⊖	5-9				●	F	*
Matricaria discoidea Strahlenlose Kamille			0,15	⊙	15	⊖	5-8	4	👉	7			*
Matricaria inodora → Tripleurospermum perforatum													
Matricaria recutita Echte Kamille	❖		0,05	⊙	25	⊖	5-7	5	👉	5			*
Matricaria recutita Kulturform Echte Kamille			0,09	⊙	25	⊖	5-7		👉				*
Medicago lupulina Kulturform Gelbklee			1,60	⊙	20	⊖	5-9		👉		●		
Medicago sativa Kulturform Luzerne			2,00	2	60	⊖	6-9		👉		●	R	
Melampyrum arvense Ackervachtelweizen		★	11,00	⊙	20	⊖	5-7	5	👉	8	●	R	
Melica ciliata Wimperperlgas			0,50	2	45	⊖	5-6	8	👉	7			
Melica nutans Nickendes Perlgas			2,50	2	40	⊖	5-6	10	👉	7			
Melica uniflora Einblütiges Perlgas	❖		4,00	2	40	⊖	5-6	10	👉	6			
Melilotus alba , Kulturform Weißer Bokharaklee			2,00	⊙	75	⊖	6-8		👉		●		
Melilotus officinalis Kulturform Gelber Bokharaklee			2,00	⊙	60	⊖	6-9		👉		●		*
Mentha pulegium Kulturpflanze Poleiminze			0,07	2	20	⊖	7-9		👉				*
Meum athamanticum Bärwurz		★	8,00	2	25	⊖	5-6	7	👉	3		R	*
Milium effusum Flattergras	❖		1,40	2	75	⊖	5-7	10	👉	5			
Molinia caerulea Pfeifengras		★	1,00	2	70	⊖	6-8	2	👉	7		R	
Myosotis arvensis Ackervergissmeinnicht	❖		0,25	⊙	20	⊖	4-10	4	👉		●		
Myosotis sylvaticus Kulturform Waldvergissmeinnicht			0,65	⊙	30	⊖	5-7		👉		●		
Myrrhis odorata Süßdolden		★	35,00	2	60	⊖	5-7	4	👉	3			*

❖ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheingraben in Produktion 🌿 Gras ⊙ einjährig ⊕ zweijährig 2 Staude

Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft,

6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldboden



	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütemonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Nardus stricta Borstgras			0,60	2	20	⊖	5-6	7	👉	2			
Nigella sativa Kulturpflanze Schwarzkümmel			2,00	⊙	25	⊖	5-8				●		*
Oenothera biennis Gemeine Nachtkerze	❖		0,45	⊕	75	⊖	6-8	4	👉	7	●	R	*
Onobrychis sativa Kulturform Esparsette			19,00	2	45	⊖	5-7		👉		●	R	
Onobrychis viciifolia Esparsette			20,00	2	45	⊖	5-7	6	👉	8	●	R	
Ononis spinosa Dorniger Hauhechel		★	4,50	2	35	⊖	6-8	6	👉	7	●	R	
Onopordon acanthium Gemeine Eselsdistel	❖		12,00	⊕	120	⊖	7-9	4	👉	7	●		*
Origanum vulgare Brauner Dost	❖		0,08	2	40	⊖	7-10	9	👉	8	●	R	*
Papaver argemone Sandmohn	❖		0,15	⊙	20	⊖	4-6	5	👉	5			
Papaver dubium Saadmohn	❖		0,11	⊙	45	⊖	5-6	5	👉	5			
Papaver rhoeas Klatschmohn	❖	★	0,11	⊙	50	⊖	5-7	5	👉	7	●		*
Pastinaca sativa Pastinak	❖		3,00	⊙	70	⊖	7-9	5	👉	8	●	R	*
Pastinaca sativa Kulturform Pastinak			4,50	⊙	70	⊖	7-9				●	R	*
Petrorhagia prolifera Sprossende Felsennelke	❖		0,20	⊙	30	⊖	6-10	7	👉	7	●		
Petrorhagia saxifraga Felsennelke	❖		0,15	2	15	⊖	7	6	👉	8			
Petroselinum sativum Kulturpflanze Petersilie			2,00	⊙	75	⊖	6-7						*
Phacelia tanacetifolia Kulturpflanze Büschelschön			1,80	⊙	60	⊖	5-9				●		
Phalaris arundinacea Rohrglanzgras			0,90	2	125	⊖	6-7	1	👉	7			
Phalaris arundinacea Kulturform Rohrglanzgras			0,90	2	125	⊖	6-7		👉				
Phleum phleoides Glanzlieschgras	❖		0,16	2	35	⊖	6-7	6	👉	8			
Phleum pratense Wiesenlieschgras			0,40	2	65	⊖	5-8	3	👉				
Phleum pratense Kulturform Wiesenlieschgras			0,40	2	65	⊖	5-8		👉				

👉 trocken 🌿 mäßig feucht 🌿 feucht 🌿 sehr feucht 🌿 sonnig 🌿 schattig 🌿 halbschattig % indifferent

Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.

	Kalkkeimer	Hartschlag	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Pimpinella major Große Bibernelle	❖		1,90	2	70	○	6-9	3	●	7		*	
Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle	❖		1,00	2	35	○	6-10	6	●	%	R	*	
Pimpinella saxifraga Kulturform Kleine Bibernelle			0,40	2	35	○	6-10					*	
Plantago lanceolata Spitzwegerich	❖		2,00	2	25	○	4-9	2	●	%	R	*	
Plantago lanceolata wild nicht heimisch Spitzwegerich			1,80	2		○	5-9	≈			R	*	
Plantago major Großer Wegerich	❖		0,25	2	20	○	6-10	5	●	%	R		
Plantago media Mittlerer Wegerich			0,25	2	25	○	5-7	6	●	8	R		
Poa annua Einjährige Risppe			0,40	⊙	15	■	1-12	%	●	6			
Poa compressa Kulturform Platthalmrispe			0,17	2	35	■	6-7		●				
Poa nemoralis Kulturform Hainrispe			0,25	2	35	■	6-7		●				
Poa pratensis Wiesenrispe			0,30	2	30	■	5-6	3	●	%	R		
Poa pratensis Kulturform Wiesenrispe			0,30	2	30	■	5-6		●		R		
Poa trivialis Kulturform Gewöhnliche Risppe			0,25	2	55	■	5-6		●				
Polygonum aviculare Vogelknöterich		★	1,60	⊙	15	○	6-10	5	●			*	
Polygonum bistorta → Bistorta officinalis													
Polygonum persicaria Flohknöterich		★	1,80	⊙	35	○	7-10	5	●				
Potentilla argentea Silberfingerkraut	❖		0,11	2	25	●	6-8	8	●				
Potentilla erecta Blutwurz			0,45	2	15	●	6-8	7	●	%		*	
Potentilla intermedia Mittleres Fingerkraut	❖		0,20	⊙	35	●	6-9	4	●	7			
Potentilla recta Aufrechtes Fingerkraut	❖		0,35	2	50	●	6-7	8	●	5			
Potentilla verna Frühlingsfingerkraut			0,60	2	10	●	3-4	6	●	7			
Primula elatior Waldschlüsselblume	❖	★	0,75	2	15	●	3-4	2	●	7			

❖ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheingraben in Produktion ■ Gras ⊙ einjährig ⊕ zweijährig 2 Staupe

Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft,

6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldboden



	Kalkkeimer	Hartschlag	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Primula veris Frühlingsschlüsselblume		★	1,20	2	15	●	4-5	6	●	8	R	*	
Prunella grandiflora Großblütige Braunelle			0,75	2	20	●	6-9	5	●	8			
Prunella vulgaris Gemeine Braunelle	❖		0,80	2	15	●	6-9	3	●	7			
Pseudolysimachion longifolium Langblättriger Blauweiderich	❖		0,08	2	80	●	7-8	3	●	7			
Pulsatilla vulgaris Gemeine Küchenschelle		★	2,00	2	22	●	3-4	6	●	6		*	
Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß	❖		1,60	2	65	●	5-7	3	●	%			
Ranunculus auricomus Goldhahnenfuß			1,60	2	32	●	4-5	10	●	8			
Ranunculus bulbosus Knolliger Hahnenfuß			3,50	2	25	●	5-7	6	●	7			
Ranunculus lanuginosus Wolliger Hahnenfuß			1,20	2	65	●	5-7	10	●	7			
Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß	❖		1,80	2	25	●	5-9	5	●				
Ranunculus sardous Rauhaariger Hahnenfuß	❖		1,40	⊙	20	●	5-9	4	●				
Raphanus raphanistrum Hederich	❖		6,00	⊙	40	○	5-8	5	●	4		*	
Reseda lutea Wilde Resede	❖		0,80	⊙	35	●	6-9	4	●	8	R		
Reseda luteola Färberresede	❖		0,20	2	90	●	6-9	4	●	9		*	
Rhinanthus alectorolophus Zottiger Klappertopf	❖	★	4,00	⊙	30	●	5-7	2	●	7			
Rhinanthus minor Kleiner Klappertopf		★	3,00	⊙	30	●	5-8	2	●				
Rumex acetosa Wiesensauerampfer	❖		0,40	2	45	●	5-6	2	●	%	R	*	
Rumex acetosella Kleiner Sauerampfer	❖		0,55	⊙	15	●	5-8	8	●	2	R	*	
Rumex crispus Krauser Ampfer	❖		1,30	2	75	●	6-8	4	●	%			
Ruta graveolens Kulturpflanze Weinraute			2,00	2	45		6-8				R	*	
Salvia nemorosa Hainsalbei	❖		1,10	2	35	●	5-6	5	●		F		
Salvia officinalis Kulturpflanze Gartensalbei			7,50	2	50	●	6-7				F	*	
Salvia pratensis Wiesensalbei	❖		1,80	2	45	●	4-8	6	●	8	R		
Salvia verticillata Quirlblütiger Salbei			0,95	2	45	●	6-9	6	●	%			

● trocken ● mäßig feucht ● feucht ● sehr feucht ● sonnig ● schattig ● halbschattig % indifferent

Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.

	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenteaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf			5,50	2	30	6-7	6		8	•	R	*	
Sanguisorba minor wild nicht heimisch Kleiner Wiesenknopf			5,50	2	40	6-7				•		*	
Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf	✦		2,50	2	70	6-9	2		%		R	*	
Sanicula europaea Waldsanikel		✦	3,50	2	30	5-6	10		8			*	
Saponaria ocymoides Rotes Seifenkraut			2,00	2	10	5-6	8		9				
Saponaria officinalis Gemeines Seifenkraut	✦	✦	1,50	2	50	7-8	5		7		F	*	
Saxifraga granulata Knöllchensteinbrech	✦	✦	0,02	2	25	5-6	2		%	5			
Scabiosa columbaria Taubenskabiose			1,80	2	40	6-10	6		8	•	R		
Schoenoplectus lacustris Seebins	✦		2,00	2	150	6-7	1		7				
Scirpus sylvaticus Waldsimse	✦	★	0,09	2	65	5-8	2		4				
Scrophularia nodosa Knotige Braunwurz	✦		0,09	2	75	6-8	10		6	•	F	*	
Scrophularia umbrosa Geflügelte Braunwurz	✦		0,06	2	75	6-8	1		8	•	R		
Securigera varia Bunte Kronwicke	✦	★	5,00	2	80	6-8	9		9		R		
Securigera varia wild nicht heimisch Bunte Kronwicke		★	3,50	2	80	5-9					R		
Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer	✦		0,03	2	10	6-7	8		%				
Sedum album Weißer Mauerpfeffer			0,02	2	10	6-7	8		%		R		
Sedum reflexum →	Sedum rupestre												
Sedum rupestre Tripmadam			0,07	2	30	7	8		5	•		*	
Sedum spurium Kulturpflanze Kaukasus-Fetthenne			0,07	2	10	7-8							
Sedum telephium Purpurfetthenne	✦	✦	0,04	2	35	6-8	9		7		R	*	
Senecio aquaticus Wassergreiskraut	✦		0,25	2	30	7-10	2		4				
Senecio erucifolius Raukenblättriges Greiskraut	✦		0,30	2	85	8-10	6		8				
Senecio jacobaea Jakobsgriskraut	✦		0,30	2	60	6-7	3		7	•	R		

✦ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheingraben in Produktion ✦ Gras ⊙ einjährig ⊕ zweijährig 2 Stauden

Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft,

6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldböden



	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenteaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Senecio nemorensis Fuchs-Greiskraut			1,00	2	100	7-9	9		%				
Senecio vernalis Frühlingsgreiskraut			0,19	⊙	25	4-5	5		7				
Setaria viridis Grüne Borstenhirse	✦		1,80	⊙	30	7-10	5						
Silau silaus Wiesensilge	✦		2,50	2	75	6-8	2		7				
Silene alba →	Silene latifolia												
Silene conica Kegelfrüchtiges Leimkraut	✦		0,20	⊙	25	6-7	8		5				
Silene dioica Rote Lichtnelke	✦		0,70	2	55	4-6	9		%	7	•	F	
Silene flos-cuculi Kuckuckslichtnelke	✦		0,10	2	45	5-7	2		%		F		
Silene latifolia Weiße Lichtnelke	✦		0,80	2	65	6-9	4		%		F		
Silene nutans Nickendes Leimkraut	✦		0,35	2	40	6-8	9		7		F		
Silene vulgaris Aufgeblasenes Leimkraut	✦		0,75	2	30	5-9	6		7	•	F	*	
Sisymbrium officinale Wegrauke	✦		0,25	⊙	45	5-8	5						
Solanum dulcamara Bittersüßer Nachtschatten	✦		1,70	2	60	6-8	10		%				
Solanum nigrum Schwarzer Nachtschatten			0,80	⊙	45	6-10	5		7				
Solidago canadensis Kanadische Goldrute			0,06	2	125	8-9	4		%				
Solidago virgaurea Gewöhnliche Goldrute			0,55	2	55	7-10	7		4	•		*	
Sparganium erectum Igelkolben	✦		12,00	2	40	7-9	1		7				
Spartium scoparium →	Cytisus scoparius												
Spergula arvensis Ackerspergel			0,80	⊙	20	6-8	5		2				
Stachys palustris Sumpfschachtel	✦		1,30	2	65	6-9	2		7	•			
Stachys recta Aufrechter Ziest			1,50	2	60	6-10	6		8	•	R		
Stachys sylvatica Waldziest	✦		1,20	2	65	6-9	10		7	•			
Stellaria graminea Grasstermiere	✦		0,30	2	20	4-6	3		4				
Stellaria holostea Große Stermiere	✦		2,00	2	25	4-6	10		6				
Stellaria media Vogelmiere	✦		0,40	⊙	15	3-10	5		7			*	

☐ trocken ☒ mäßig feucht ☑ feucht ☑ sehr feucht ☐ sonnig ☑ schattig ☑ halbschattig % indifferent

Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.

	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenteaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Stipa capillata Haarfedergras	❖		4,50	2	65	7-8	6	🌊	☀️	8			
Succisa pratensis Teufelsabbiss	❖		1,60	2	30	7-9	3	🌊	☀️	%	•	R	
Symphytum officinale Beinwell	❖		9,50	2	55	5-7	2	🌊	☀️	%	•		*
Taraxacum officinale Löwenzahn	❖		0,55	2	22	4-7	3	🌊	☀️		•	R	
Teucrium chamaedrys Edelgamander			1,50	2	22	7-8	6	🌊	☀️	8	•		*
Teucrium scorodonia Salbeigamander	❖		0,70	2	27	6-9	10	🌊	☀️	2	•	F	
Thlaspi arvense Ackerhellerkraut	❖		1,20	⊙	20	5-6	5	🌊	☀️	7			
Thymus pulegioides Feldthymian	❖		0,13	2	13	6-9	7	🌊	☀️	%	•	R	*
Thymus serpyllum Sandthymian	❖		0,17	2	7	6-9	8	🌊	☀️	5	•		*
Thymus vulgaris Kulturform Gartenthymian			0,25	2	25	6-10					•		*
Torilis japonica Klettenkerbel	❖	❄️	1,40	⊙	65	7-8	9	🌊	☀️	8			
Tragopogon porrifolius Haferwurz			15,00	⊙	60	6-8		🌊	☀️	7			*
Tragopogon pratensis Wiesenbocksbart	❖		7,50	2	50	5-7	3	🌊	☀️	7			
Trifolium arvense Hasenkleee	❖	★	0,40	⊙	25	6-9	8	🌊	☀️	2			
Trifolium campestre Feldkleee	❖	★	0,20	⊙	15	6-9	8	🌊	☀️	8			
Trifolium dubium Fadenkleee			0,50	⊙	15	5-9	3	🌊	☀️	5			
Trifolium pratense Rotkleee			1,30	2	25	6-9	2	🌊	☀️	%	•	R	
Trifolium pratense Kulturform Rotkleee			1,80	2	25	6-9		🌊	☀️		•	R	
Trifolium repens Kulturform Weißkleee			0,65	2	20	5-10		🌊	☀️		•	R	
Trigonella foenum-graecum Kulturpflanze Bockshornkleee			19,00	⊙	30	6-7							*
Tripleurospermum perforatum Geruchlose Kamille	❖		0,30	⊙	50	6-10	5	%	☀️	6			
Trisetum flavescens Kulturform Goldhafer			0,25	2	45	5-9		%	☀️				
Trollius europaeus Trollblume		❄️	0,70	2	30	5-6	1	🌊	☀️	7			

❖ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheinregion in Produktion 🌱 Gras ⊙ einjährig ⊕ zweijährig 2 Staude

Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft,

6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldboden

	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenteaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Tussilago farfara Gemeiner Huflattich			0,11	2	13	2-4	4	🌊	☀️	8	•	R	*
Typha angustifolia Schmalblättr. Rohrkolben	❖		0,03	2	150	6-8	1	🌊	☀️	7			
Urtica dioica im Kelch Große Brennnessel	❖		0,19	2	105	6-9	4	🌊	%	6		R	*
Urtica urens Kleine Brennnessel			0,50	⊙	30	6-10	4	🌊	☀️	%			*
Vaccaria hispanica Kuhkraut			5,00	⊙	45	6-8	5	🌊	☀️	9			
Valeriana officinalis Baldrian	❖		0,50	2	110	7-8	2	🌊	☀️	7			*
Valeriana officinalis Kulturform Baldrian			0,65	2		7-8		🌊	☀️				*
Verbascum densiflorum Großblütige Königskerze	❖		0,11	⊕	125	7-9	5	🌊	☀️	8	•		
Verbascum lychnitis Mehlige Königskerze	❖		0,12	⊕	95	6-8	9	🌊	☀️	7	•	F	
Verbascum nigrum Schwarze Königskerze	❖		0,09	⊕	75	6-8	9	🌊	☀️	7	•		
Verbascum phlomoides Filzige Königskerze			0,09	⊕	125	7-8	5	🌊	☀️		•		*
Verbascum phoeniceum Purpurrote Königskerze			0,11	2	45	5-7	6	🌊	☀️	7	•		
Verbascum thapsus Kleinblütige Königskerze	❖		0,10	⊕	105	7-9	5	🌊	☀️	7	•		*
Verbena officinalis Eisenkraut	❖		0,40	2	40	7-9	4	🌊	☀️				*
Veronica arvensis Feldehrenpreis	❖		0,20	⊙	17	3-9	8	%	☀️	6	•		
Veronica chamaedrys Gamanderehrenpreis	❖		0,20	2	20	4-6	3	🌊	☀️	%	•		
Veronica hederifolia Efeublättriger Ehrenpreis	❖		4,00	⊙	18	3-5	5	🌊	☀️	7			
Veronica officinalis Echter Ehrenpreis	❖		0,12	2	18	5-7	10	🌊	☀️	3			*
Veronica persica Persischer Ehrenpreis	❖		0,55	⊙	25	2-9	5	🌊	☀️	7			
Veronica teucrium Großer Ehrenpreis		★	0,25	2	28	6-7	9	🌊	☀️	8		R	
Vicia cracca Vogelwicke	❖	★	40,00	2	75	6-8	3	🌊	☀️	%	•	R	
Vicia sepium Zaunwicke	❖		16,00	2	40	5-8	3	🌊	%	6			
Viola arvensis Ackerstiefmütterchen	❖	❄️	0,60	⊙	15	5-10	5	%	☀️	%	•	R	*

🌊 trocken 🌊 mäßig feucht 🌊 feucht 🌊 sehr feucht ☀️ sonnig ☁️ schattig 🌑 halbschattig % indifferent

Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter.



	Kaltkeimer	Hartschalig	TKM	Höhe/cm	Blütenfarbe	Blütenmonate	Pflanzengesellschaft	Feuchte	Licht	Bodenreaktion pH	Bienen-/Hummeltracht	Schmetterlinge	Heil-/Genusspfl.
Viola odorata Duftveilchen		❄	3,00	4	7	3-4	4	💧	☀				✱
Viola tricolor Wildes Stiefmütterchen	❄	❄	0,55	⊙	12	5-10	9	%	☀				
Vulpia myuros Mäuseschwanz- Federschwingel			0,55	⊙	35	5-7	8	💧	☀				

☁ trocken 💧 mäßig feucht 🌊 feucht 🌊 sehr feucht ☀ sonnig ☁ schattig ☀ halbschattig % indifferent
Schmetterlinge: Nahrung für R-Raupen u./o. F-Falter

❄ Auch als Regio-Saatgut nördlicher Oberrheingraben in Produktion 🌱 Gras ⊙ einjährig ☉ zweijährig 4 Staude
Pflanzengesellschaft: 1 Ufer, 2 Feuchtwiese, 3 Frischwiese, 4 Stickstoffkrautflur, 5 Ruderalgesellschaft,
 6 Kalkmagerrasen, 7 Steppenrasen, 8 Sand- u. Feldrasen, 9 Waldsaum, 10 Laubwaldboden

LITERATUR- UND ORIENTIERUNGSEMPFEHLUNGEN

Internet

www.floraweb.de: Umfassendes Pflanzenverzeichnis mit ökologischen Informationen
www.naturgucker.de: Fotos und Fundorte der einzelnen Pflanzen
www.natur-im-vvw.de: Verband deutscher Wildsamens- und Wildpflanzenproduzenten e.V.; Informationen zur Zertifizierung als Regio-Saatgut und Karte mit den Regionen
www.regionalisierte-pflanzenproduktion.de/artenfilter.htm: Listen von Arten, die in den jeweiligen Regionen als Regio-Saatgut für die freie Landschaft verwendet werden können

Bücher

Henning Haeupler, Thomas Muer: **Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands**, Ulmer Verlag
 Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: **Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands**, Quelle & Meyer
 Ellenberg, Weber, Düll, Wirth, Werner: **Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa**, Goltze Verlag
 Erich Oberdorfer: **Pflanzensoziologische Exkursionsflora**, Ulmer Verlag
 Reinhard Witt: **Wildpflanzen für jeden Garten; Anzucht, Pflanzung, Pflege**, BLV München
 Steffen G. Fleischhauer, Jürgen Guthmann, Roland Spiegelberger: **Essbare Wildpflanzen; 200 Arten bestimmen und verwenden**, AT-Verlag